

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה

תאריך: כ"ח באלול, תשע"ד
23 בספטמבר 2014
חוזר: משב/2014/09

אל: מנהלי הלשכות הווטרינריות

הנדון: חיסון מקנה נגד מחלת הפה והטלפיים (פו"ט), 2014 – 2015

ביום 01.10.14 יש להתחיל בחיסון השנתי של הבקר, הצאן והחזירים לעונת 2014 – 2015.

בקר

כל הבקר יחוסן בתרכיב **פה וטלפיים (פו"ט)** כדלקמן:

תרכיב פו"ט תלת-ערכי באמולסיה שומנית

אצוות בשימוש: **O 424 + O 411**

ההרכב האנטיגני של התרכיב:

טיפוס **O** מכיל את האנטיגנים: O Manisa + O-3039 + O-4625 + Israel 2007

טיפוס **A** מכיל את האנטיגנים: A- 4165 + A Iran 05

טיפוס **ASIA 1** מכיל את האנטיגן: Asia 1 Shamir

לקראת ההזרקה יובא התרכיב לטמפרטורה של $15^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. התרכיב יוזרק תוך שרירית בצוואר. אין לערבב את תרכיבי הפו"ט עם תרכיבים אחרים; ניתן לשלב את מועד החיסון עם חיסון אחר. אין להשתמש בתרכיבים שפג תוקפם.

1. בקר לחלב:

יש לחסן את כל הבקר לחלב מגיל חודשיים (2 ח') כנגד פו"ט ולסיים את החיסון עד סוף חודש דצמבר 2014.

1) עגלים/ות ברפתות החלב יחוסנו לפחות פעמיים, לכל המאוחר עד לגיל של 6 חודשים. החיסון השני יינתן לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר קבלת החיסון הראשון.

2) ברפתות בהן תבוצעה בדיקות שחפת, יש לשלבן עם חיסון הפו"ט, כאשר החיסון יתבצע בזמן קריאת תוצאות בדיקת השחפת.

3) כל חיסון אחר ו/או חיסון נוסף יבוצע עפ"י בקשת המגדל על ידי הרופא המטפל בלבד.

2. בקר לבשר במרעה:

יש לחסן את כל הבקר לבשר מגיל חודשיים (2 ח') ומעלה כנגד פו"ט. אמהות ועגלות תחלופה תחוסנה עד סוף חודש ינואר 2014. חיסון הוולדות יבוצע מוקדם ככל האפשר – מגיל חודשיים ולכל המאוחר עד הגמילה.

1) כל קבוצת גמולים לאחר החיסון הראשון תקבל חיסון דחף אחד נוסף כנגד פו"ט.

2) עגלות תחלופה תהיינה מחוסנות לפחות פעמיים עד לגיל של 10 חודשים.

3) בעת שגרה אין להוציא עגלים מעדרי הבקר לבשר למשקים אחרים אלא לאחר שחוסנו לפחות פעם אחת כנגד פו"ט; בעת התפרצות מחלה לאחר שחוסנו לפחות פעמיים (2x)! בשני המקרים יוצאו העגלים מהעדר לאחר 10 ימים לפחות ממועד החיסון!

4) כל חיסון אחר ו/או חיסון נוסף יבוצע עפ"י בקשת המגדל על ידי הרופא המטפל בלבד.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה

3. חיסון במפטמות של עגלים מקומיים ועגלי יבוא

כל מנהל לשכה ימנה רופא אחראי לנושא החיסונים במפטמות שמתפקידו יהיה להכין רשימה מפורטת (בלוח אקסל) של כל המפטמות בתחום הלשכה ולעקוב ולוודא ביצוע תכנית החיסון.

ברשימה יצוין:

- א. תאריך הגעת העגלים למפטמה.
 - ב. מקור העגלים – ליד עגלי היבוא תצוין ארץ מוצאם.
 - ג. מצב החיסונים ומועד ביצועם טרם כניסת העגלים למפטמה.
- לתשומת לבכם: 4 – 6 שבועות לאחר הגעת העגלים למפטמה, חובה לחסנם בחיסון דחף כנגד פו"ט. ככלל, יש להיכנס לפחות אחת לארבעה חודשים לכל מפטמה!

הנחיות החיסון בהתאם למקור העגלים:

- (1) עגלים מקומיים (ילידי הארץ) הנמכרים מרפת החלב בגילאים של עד חודשיים – יחוסנו פעמיים במפטמה הקולטת עד גיל 6 חודשים.
- (2) עגלים גמולים מעדרי הבקר לבשר – יקבלו חיסון ראשון בעדר המקור וחיסון שני עד 6 שבועות לאחר קליטתם במפטמה.
- (3) עגלי יבוא (מאירופה ומאוסטרליה) – יקבלו חיסון ראשון בתחנות ובמקומות ההסגר המאושרים (רמלה, חיפה, דור, צופר ואילות), ובמקומות נוספים אם וכאשר יאושרו, וחיסון שני עד 6 שבועות לאחר קליטתם במפטמה.

צאן

כל הצאן יחוסן בתרכיב **פה וטלפיים** דו-ערכי באמולסיה שומנית.

O 410 + O 399 + O 365 בשימוש:

ההרכב האנטיגני של התרכיב:

טיפוס **O** מכיל את האנטיגנים: O-4625 + O-3039 + O Manisa .

טיפוס **A** מכיל את האנטיגן: A- Iran 2005 + A- 4165

לקראת ההזרקה יובא התרכיב לטמפרטורה של $15^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. התרכיב יוזרק תוך שרירית בצוואר. אין לערבב את תרכיבי הפו"ט עם תרכיבים אחרים; ניתן לשלב את מועד החיסון עם חיסון אחר. אין להשתמש בתרכיבים שפג תוקפם.

- (1) הצאן יחוסן מגיל חודשיים ומעלה, כל עדר במועדו השנתי. יש להקפיד על 12 חודשים מחיסון קודם.
- (2) גיל חיסוני השגר – לאמהות מחוסנות מגיל 2 חודשים, לאמהות לא מחוסנות מגיל 1 יום.

חזירים

כל החזירים יחוסנו השנה בתרכיב **פה וטלפיים** תלת-ערכי באמולסיה שומנית.

O 411 בשימוש:

ההרכב האנטיגני של התרכיב: מפורט לעיל (ראו בקר)

יש להקפיד לקראת ההזרקה להביא את התרכיב לטמפרטורה של $15^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. התרכיב יוזרק תוך שרירית מאחורי האוזן.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה

במסגרת החיסון השנתי הכללי, הן בלשכת הגליל המערבי (עכו-נצרת) והן בלשכת הנגב (באר-שבע), יש לחסן את כל האמהות והמבכירות ("גיפרות") וכן את כל החזירים הצעירים והחזירות הצעירות המיועדים לעדר הרבייה.

לתשומת לבכם: אין לחסן אמהות בשבועיים האחרונים של ההיריון. החיסון של אמהות אלה יבוצע 7 – 14 ימים לאחר ההמלטה.

כל חיסון אחר ו/או חיסון נוסף יבוצע עפ"י בקשת המגדל על ידי הרופא המטפל.

פינות חי וגני חיות

- 1) בקר, צאן וחזירים יחוסנו בהתאם למפורט לעיל.
- 2) בעלי חיים אחרים, לרבות חיות בר בשבייה, יחוסנו בהתאם ל"הנחיות לחיסון בפינות חי" שתפורסמה בימים הבאים.

בברכה,



ד"ר ר. עוזרי
מנהל השירותים הווטרינריים בשדה

רשימת תפוצה:

מנהל השירותים הווטרינריים
מנהל המכון הווטרינרי
רופא וטרינר ראשי ליבוא ויצוא
רופא וטרינר למחלות צאן
רופא וטרינר ארצי למחלות חזירים
רופא וטרינר אחראי לקלוטי פרסה, גמלים ופינות חי
רופא וטרינר אחראי על פיקוח תכשירים וטרינריים
מ"מ מנהל המעבדה לאבחון ויראלי
מ"מ מנהל המעבדה לפה וטלפיים
מנהלי חטיבות, המכון הווטרינרי
רופא וטרינר ראשי "החקלאית"
רופא וטרינר רשות הטבע והגנים
אתר אינטרנט שו"ט