



6.10.10

דף מידע לרפתנים בנושא קדחת קיקיונית (3 הימים)

מתי התחיל: מקרים ראשונים דווחו ואומתו כבר באוגוסט, ההתפרצות הרחבה מספטמבר.

איפה: עד כה אובחנה המחלה בקרוב למאה רפתות בעשרות יישובים ברחבי הארץ. בדיקות מעבדה מאמתות מראות על תפרוסת מקרים החל מצפון הנגב, מישור החוף לכל אורכו, השפלה, עמק חפר וגליל מערבי. נכון להיום אין דיווח על מקרים קליניים לאורך הירדן, עמק החולה ועמקי יזרעאל.

החומרה: ברוב הרפתות נפגע מספר קטן של פרות. במספר משקים בעמק חפר ובשפלה נפגעו עשרות אחוזים מאוכלוסיית החולבות. יש מקרים חוזרים. חומרת הפגיעה משתנה מצליעה קלה, ריור וירידה קלה בחלב ועד נפחת (אמפיזמה), רביצה, תמותה והפלות.

חיסון: לצערנו, כל מאמצינו מסיום התפרצות 2009 ועד תחילת קיץ 2010 להניע את המכון הוטרינרי לייצר עוד מנות תרכיב לא צלחו. שארית המנות מ 2009 חולקה למשקים באזורי סיכון גבוה המחסנים כבר מספר שנים. בכמות שעמדה לרשותנו לא היה ניתן לחסן את כל העדרים שרצו בכך. השבוע, באיחור רב, הגיעו מהמכון הוטרינרי למחסן "החקלאית" 10,000 מנות תרכיב נוספות. נא להתייעץ עם הרופא המטפל האם והיכן עדיין יש טעם לחסן לשנה זאת.

טיפול: הטיפול הוא טיפול מקל ותומך בתכשירים מקבוצת נוגדי הדלקת הלא סטרואידים (NSAID) (פינדין, פלוניקסין, טולפיין, קטופרופן). תרופות אלו מקלות על הסימנים הקליניים. נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי אופן השימוש הנכון, המועיל והמושכל.

מניעה: העברת המחלה מתבצעת על ידי חרקים מעופפים עוקצים. סקירה ממצה של האמצעים מאת ד"ר מאור קדמי מצורפת בהמשך להודעה זאת, וזמינה גם באתר החקלאית למנויי האתר.

צא מתי: מניסיון ההתפרצויות בעבר, תקופת הסיכון להופעת המחלה ברפתות נוספות והופעת מקרים חדשים או חוזרים ברפתות שכבר נפגעו נמשכת עד בוא החורף. צניחת הטמפרטורות (לא הגשם) מביאה לירידה בפעילות החרקים המעבירים ולסיום ההתפרצות.

תיאור: לצרכי ביטוח ולצרכי מחקר וייעול התגובה בעתיד אנא תעדו בכל רפת את פרטי הפרות שחלו. את המאובחנות, המטופלות, המפילות, היוצאות לשחיטה דחופה והמתות.

צא כן: "החקלאית" מעבירה לפחות אחת לשבוע מידע עדכני על ההתפרצות, דרך הרופאים המטפלים ובאתר החברה.

בברכה,

ד"ר גלאון נדב,
רופא ראשי, "החקלאית"